INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NOVASONE®

Furoato de Mometasona 1 mg/g

Crema, Loción y Ungüento – Vía Tópica

VENTA BAJO RECETA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, ya que contiene información importante para usted.

- Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado solo para usted. No se lo transmitas a otros. Puede dañarlos, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si tiene alguna reacción adversa, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este prospecto. Ver la sección 4.

Qué hay en este prospecto

1. Qué es NOVASONE y para qué se utiliza
2. Qué debo saber antes de empezar a utilizar NOVASONE
3. Cómo usar NOVASONE
4. Posibles reacciones adversas
5. Cómo conservar NOVASONE
6. Contenido del paquete y otra información

1. Qué es NOVASONE y para qué se utiliza

NOVASONE es una preparación a base de cortisona que se fabrica a partir de la hormona cortisol, destinada a aplicación sobre la piel. Pertenece a la clase de corticosteroides potentes.

NOVASONE crema y NOVASONE ungüento están indicados para el tratamiento tópico de inflamaciones de la piel que responden favorablemente como psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis irritante y / o dermatitis de contacto alérgica.

NOVASONE loción está indicado para aliviar la inflamación y la picazón de las zonas pilosas, como el cuero cabelludo, que ocurren en dermatitis como la psoriasis.

2. Qué debo saber antes de empezar a utilizar NOVASONE

No use NOVASONE

- Si alguna vez tuvo alguna reacción alérgica inusual o grave al furoato de mometasona, a otros corticosteroides o a cualquier componente de este medicamento (listado en la sección 6).
- Si tiene acné vulgar, acné rosácea, adelgazamiento de la piel, inflamación alrededor de la boca, reacciones posteriores a la vacunación, prurito anal o genital, dermatitis del pañal, varicela, herpes y, en general, una dermatitis infectada. Consulte a su médico para asegurarse de que no tiene ninguna de estas condiciones. NOVASONE no debe aplicarse sobre la piel ulcerada.

Advertencias y precauciones

A menos que su médico se lo indique, no aplique NOVASONE debajo de los apósitos, por períodos prolongados, en áreas extensas de la piel, en la cara o en pliegues de la piel, por ejemplo, debajo de los brazos o en los pliegues de la ingle. Esta precaución es especialmente aplicable a los niños.

El tratamiento en la cara no puede exceder los 5 días.

Evite todo contacto con los ojos, pero también con heridas y membranas mucosas. NOVASONE no puede usarse en oftalmología o en los párpados.

Si los síntomas no mejoran en unos pocos días o si empeoran, consulte a su médico. Esto es especialmente importante cuando se trata la psoriasis.

Es recomendable lavarse las manos después de usar NOVASONE.

Póngase en contacto con su médico si experimenta visión borrosa u otras alteraciones visuales.

Niños y adolescentes

En niños, NOVASONE solo puede usarse siguiendo el consejo de un médico.

En niños, evite aplicar NOVASONE debajo de un vendaje.

Evite aplicar NOVASONE durante períodos prolongados, en áreas grandes de la piel, en la cara o en pliegues de la piel, por ejemplo, debajo de los brazos o en los pliegues de la ingle. El tratamiento en la cara no puede exceder los 5 días.

Dado que los niños tienen una relación superficie/peso corporal más alta que los adultos, los niños pueden ser más sensibles que los adultos a la inhibición del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y al síndrome de Cushing inducido por los glucocorticoides.

Se recomienda administrar la cantidad más baja de glucocorticoides requerida para la eficacia, particularmente en niños. El tratamiento crónico con glucocorticoides puede interferir con el crecimiento y desarrollo del niño.

Otras medicinas y NOVASONE

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos.

Embarazo y lactancia

Su médico decidirá si puede usar NOVASONE durante el embarazo o la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

NOVASONE no tiene influencia sobre la capacidad de conducir o usar máquinas.

La loción tópica NOVASONE contiene propilenglicol.

El propilenglicol puede causar irritación de la piel.

3. Cómo usar NOVASONE

Aplicación tópica. Uso externo.

Aplique una capa delgada de NOVASONE crema o NOVASONE ungüento una vez al día en el área de la piel que se va a tratar. Masajear suavemente para frotar la crema o ungüento.

Aplique unas gotas de NOVASONE loción una vez al día en las regiones pilosas, incluido el cuero cabelludo. Masajear suavemente para frotar la loción tópica.
Lávese las manos después de aplicar NOVASONE.

A menos que su médico especifique lo contrario:
- Evite suspender abruptamente el tratamiento a largo plazo;
- No le dé su medicamento a otra persona;
- No use el medicamento para otras indicaciones que no sean las recetadas.

Si usa más NOVASONE del que debiera
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 - 0800-444-8694.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 - 4658-7777.

Hasta la fecha, no se han informado casos de sobredosis de NOVASONE. Sin embargo, en caso de sobredosis, ingestión accidental o absorción por la boca, consulte a su médico de inmediato.

Si olvidó usar NOVASONE
No aplique una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si deja de usar NOVASONE
No detenga el tratamiento abruptamente. Consulte a su médico para obtener más información.
Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

4. Posibles reacciones adversas
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Se han observado las siguientes reacciones adversas: sequedad de la piel, hormigueo, picazón, forúnculos, decoloración de la piel, hipertricosis (crecimiento excesivo de pelos y cabello), cambios en la forma en que se siente la piel (parestesia), inflamación, adelgazamiento de la piel, aumento de la dilatación del pequeños vasos sanguíneos de la piel, estrías, eritema (enrojecimiento), acné, púrpura (decoloración púrpura o café rojiza de la piel), dermatitis de contacto, dolor en el sitio de aplicación, visión borrosa.
Cuando se aplica NOVASONE, especialmente NOVASONE loción, pueden producirse sensaciones de ardor e irritación.
También pueden ocurrir otras reacciones adversas cuando el área tratada de la piel está cubierta con un vendaje o cuando se tratan áreas grandes. En ese caso, comuníquese con su médico.
Si siente cualquiera de las reacciones mencionadas o si nota alguna reacción adversa no mencionada en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Reporte de efectos adversos

Si usted sufre algún efecto adverso, comuníqueselo a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no listado en este prospecto.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: ***http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificamos/pacientes*** *o llamar a* ***ANMAT responde 0800-333-1234****.*

Adicionalmente, reportar el caso a dpoc.argentina@organon.com

5. **Cómo conservar NOVASONE**

NOVASONE Crema: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

NOVASONE Loción y Ungüento: Conservar entre 2ºC y 30ºC.

No utilice este medicamento después de la fecha que figura en el envase.

6. Contenido del paquete y otra información

Qué contiene NOVASONE

- El principio activo es Furoato de Mometasona.
- Los demás componentes son:

NOVASONE crema: parafina blanca suave, cera de abejas blanca, fosfatidilcolina hidrogenada, hexilenglicol, dióxido de titanio, octenilsuccinato alumínico de almidón, agua purificada, ácido fosfórico concentrado para ajustar pH c.s.

NOVASONE loción: alcohol isopropílico, propilenglicol, hidroxipropilcelulosa, fosfato de sodio monobásico monohidrato y agua purificada.
Este medicamento contiene 300,0 mg de propilenglicol en cada mililitro de loción, lo que equivale a 3,0 g de propilenglicol por unidad (frasco de 10 ml); 6,0 g de propilenglicol por unidad (frasco de 20 ml); 9,0 g de propilenglicol por unidad (frasco de 30 ml) y 75,0 g de propilenglicol por unidad (frasco de 250 ml).

NOVASONE Ungüento: Hexilenglicol, propilenglicol estearato, cera blanca, vaselina blanca, agua purificada.
Este medicamento contiene 20,0 mg de propilenglicol estearato en cada gramo de ungüento; lo que equivale a 100,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 5 g); 200,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 10 g); 300,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 15 g); 400,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 20 g); 600,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 30 g); 900,0 mg de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 45 g) y 10 g de propilenglicol estearato por unidad (pomo de 500 g).

Presentaciones de NOVASONE

NOVASONE Crema: Pomo conteniendo 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 45 g y 500 g*.

NOVASONE Loción: Frasco conteniendo 10 ml, 20 ml, 30 ml y 250 ml*.

NOVASONE Ungüento: 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 45 g y 500 g*.

*Uso hospitalario exclusivo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: ***http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificamos/pacientes o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.***

Adicionalmente, reportar el caso a dpoc.argentina@organon.com

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 42.232

Fabricado por:
NOVASONE Crema:**Organon Heist bv**, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Bélgica.
INDUSTRIA BELGA.
NOVASONE Loción: **Eurofarma Argentina S.A.**, Av. San Martin 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
INDUSTRIA ARGENTINA
NOVASONE Ungüento: **Sanofi Aventis Argentina S.A**., Av. San Martin 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
INDUSTRIA ARGENTINA

Comercializado en Argentina por: **Organon Argentina S.R.L. Domingo de Acassuso 3.780, Olivos**, Vicente López, Prov. de Buenos Aires.
Directora Técnica: Cecilia B. Zelada, Farmacéutica.

¿Cuándo se revisó este prospecto por última vez?
Este prospecto se revisó por última vez:

© 2025 Grupo de compañías Organon. Todos los derechos reservados.

be-pl-elocom-08-2020